25. 7bre. 1755. observation d'un aneurysme faux à l'occasion d'une Saignée

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

n.° 31.

au mois de fevrier 1755. un nommé Ladboute grenadier au Regiment Royal des Vaisseaux fut saigné a la veine mediane du bras droit, par un fraté du regiment, peu de tems aprés il survint une echimose considerable qui occupoit tout l'avant bras et la main, les doigts etoient sans mouvement, de façon que toutes ces parties etoient comme paralytiques: Le même jour de cet accident je fis conduire le blessé à l'hopital militaire du quesnoy, pour quil y fut traité convenablement; mons.r Lambert Chirurgien major de cette hopital, fit appliquer sur l'avant bras une fomentation Emoliante pendant deux mois, au bout de ce tems, je visitai le blessé, je representai a m.r Lambert, quil auroit été convenable dans les premiers tems d'avoir fait plusieurs saignées au blessé, et d'avoir appliqué sur la partie des Cataplasmes, pour resoudre L'echimose, et en même tems pour relacher Les parties trop tendües que la picure de la poneurose du muscle biceps avoit occasionné, et que le blessé etoit fort heureux de ce quil ne s'etoit point fait d'abcés; sur cet avis m.r Lambert fit appliquer en forme de friction de L'huile de Laurier, depuis la partie superieure de l'avant-bras, jusqu'au bout des doigts; ce remede a été continué un mois: vraisemblablement le tems a fait dissiper L'echimose et à donné un peu plus d'aisance aux parties; Lorsque le malade fut jugé à l'hopital hors d'affaire, il luy survint tout à coup une petite tumeur à l'endroit où il avoit été saigné, elle se faisoit sentir par un mouvement de pulsation, Je jugeai que cette tumeur, qui n'excedoit point La grosseur d'un poids chiche, etoit le commencement d'un aneurysme faux,

ARC 47 n° 27

on ne fut pas Longtems à se convaincre de la réalité de ce fait, La tumeur augmentoit de jour en jour à mesure que les tuniques de l'artère cedoient plus ou moins, au mouvement du sang. Je conseillai d'appliquer sur la tumeur, une plaque de plomb, garnie de Linge, afin qu'augmentant la résistance exterieure des Tuniques, elles pretassent moins à l'effort quelles recoivent à tout instant delapart du fluide; ce moyen n'a été employé qu'en attendant un secours plus puissant, J'ecrivis pour cet effet a mr. Peron maitre en chirurgie a Paris, pour quil fit un bandage à ressort convenable, pour tenter la guérison du blessé, par la voye de la compression, mais comme il ne me parvint qu'au bout d'un certain tems, La tumeur fit beaucoup de progrés malgré la precaution qu'on avoit prise elle etoit devenue plus grosse que le poing. ayant fait sortir le malade de l'hôpital; Je fis l'appliquation du bandage, en presence de mr. Bequasse Chirurgien major du Regiment de Chabrillant Cavallerie, J'eus soin de faire rentrer le sang dans son vaisseaux; pour cet effet, Je saisi la tumeur avec les doigts de la main gauche, et de L'autre je manoeuvrai, comme dans L'opperation du taxis: Lorsque je comprimois la tumeur un peu fort elle disparoissoit; et le malade se plaignoit d'une grande douleur a l'avant bras, et d'un fremissement dans les doigts, que nous attribuames à la compression du nerf; Le Bandage resta deux Jours, le blessé n'ayant point dormi, à cause de La douleur et du Gouflemem survenu au bras et a l'avant bras, nous le levames; La tumeur aneurysmalle, nous parut considerablement applatie; Le Bandage fut rappliqué et moins serré, on saigna le blessé, et la douleur et le Gouflement se dissiperent: Le Bandage ne

fut levé qu'au bout de 4. jours, nous trouvames encore la tumeur affaissée, mais elle s'étendoit en circonference, comme elle n'excedoit point les bornes de l'ecusson, nous avions esperance d'obtenir la guerison par cette voye qui n'est point sans exemple. il y avoit d'autant plus Lieu de croire quil ne restoit plus de gonflement ny de douleur, les mouvemens de pulsation que la tumeur avoit coutume de faire ressentir avec beaucoup de violence, a peine se manifestoient-ils, le bandage fut remis, et ne fut levé qu'au bout de 5. Jours. Enfin ce fut le 14.e Jours de L'application, quil parut vers le milieu de la tumeur, une petite tache noire, Les tegumens etoient fort endurcies, nous Jugeames que le retour des Liqueurs se faisoit avec peine dans cette partie, nous desesperames de pouvoir le guerir par cette methode, nous appliquames des topiques spiritueux sur la tumeur, La petite tache gangreneuse fit tant de progrés, qu'au bout de 3. Jours elle occupoit toute la circonference de la tumeur qui avoit souffert compression de la part de l'ecusson; L'escare qui se bornoit au tegument tomba dans l'espace de 6. jours, cette playe qui étoit de figure presque ronde, étoit plus grande qu'un écu de six livres, La tumeur avoit la forme ~~[illegible]~~ d'avigneu se, se presentoit trés à decouvert n'étant plus retenuë que des tuniques de L'artére, les battemens se faisoient remarquer trés visiblement; ayant voulu lever L'appareil, le sang arteriel se fit Jour par une rupture qui se fit à la partie externe de la tumeur, J'en tirai la valeur d'une bonne saignée, J'arretai le sang avec assé d'aisance au moyen de la charpie, des compresses et quelques tours de bandes. L'etat du blessé me parut demander des secours plus réels que ceux que nous avions déja employés, comme je n'etois point le maitre de lui donner tous mes soins, je fus forcé de le faire conduire une seconde fois

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

à l'hôpital, le jour de son arrivée, il lui survint une ~~[illegible]~~ hémorragie considerable
n'ayant personne dans cet hôpital en etat de le secourir, je m'y transportai avec
mr. Bequasse, où nous le trouvames baigné dans son sang; nous eumes recours
pour l'arrêter promptement à l'agarie, qui seconda heureusement nos
intentions, nous aurions même procédé aussitôt à l'operation de l'aneurysme,
si mr. Lambert n'avoit point quitté ce jour là son hopital. Le lendemain le
bras et l'avant-bras se trouverent fort gonflés, mr. Lambert étoit d'avis
d'amputer le bras, je me trouvai contraire à son opinion, aussi bien que mr.
Bequasse; je lui representai que la bonne chirurgie nous offroit des moyens
presque sur pour conserver le bras, et que mon avis étoit, sans avoir égard
si l'artere brachialle etoit piquée à son tronc, ou à ses branches et même
s'il se trouvoit des vaisseaux collateraux, d'ouvrir la tumeur par une incision,
et de decouvrir l'endroit de l'artere qui fournissoit le sang, et de l'arreter par
le moyen de l'agarie; si ce moyen ne suffisoit point que nous avions la
Ligature. les raisons ont prevalu, ayant appliqué le tourniquet, on
leva l'appareil, aussitot le sang sortit de la grosseur du doigt avec tant
de vehemence que mr. Lambert en fut effrayé; dans l'instant je portai
mon doigt dans l'ouverture, je fis serrer le tourniquet, j'avertis mr.
Lambert qui tenoit l'instrument d'incisser sur mon doigt afin de ne point
toucher au tendon du muscle biceps, l'incision ayant été prolongée du haut
et du bas, le sac resta à decouvert, j'en tirai plusieurs couches de sang
endurcis, qui se tenoi~~ent~~ par feuillets, ayant vuidé le sac, le fond se montra
fort lisse de la largeur de deux pouces; je fis lacher le tourniquet

pour découvrir le vaisseau qui donnoit, C'etoit L'artere ~~Ridiale~~ Radiale ; ayant bien reconnu le diamettre du Vaisseau j'y appliquai Lagarie que je soutins par des bourdonnets roulés dans la poudre de Colophone et par dessus une poignée de Charpie, des Compresses méthodiquement appliquées et le Bandage, Le sang s'arreta, quoi que le Tourniquet ne fut que très peu serré qui resta appliqué au bras. Le pouls se faisoit sentir très foiblement, le blessé fut saignée deux fois, dans les 24. heures, la fievre etoit forte accompagnée de moiteurs et d'une petite toux séche ; le second et le 3.e Jour il fut encore saigné, la fievre et les sueurs augmenterent, de telle sorte que le Gonflement du bras et de lavant bras disparut ce qui occasionna une grande difficulté de respirer, malgré ce contretems il ne survint point ~~Lemoragie~~ L'hémorragie, le 4.e Il fut résaigné de nouveau, il parut a la poitrine une quantité de petite pustules rouges, il fut pensé à cause du grand relachement du bandage et d'une suppuration putride, qui découloit de la playe ; on n'enleva que la charpie qui vint sans resistance, ne voulant rien forcer de crainte que le vaisseau ne fut point encore fermé, le 5.e on repensa ; La suppuration etoit encore plus abondante, on ne toucha point a la garie, La fievre etoit diminuée aussi bien que les autres accidents ; ce ne fut que le 6.e de L'operation que ~~Lemoragie~~ L'hémorragie survint a notre grand etonnement, on fut obligé de decouvrir le fond de la playe pour faire La Ligature de L'artere Radialle, qui donnoit avec beaucoup de force, on n'aperçu point que le vaisseau se fut repris en aucune maniere quoi que le blessé fut fort affoibli par la grande

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

quantité de sang quil avoit perdu, la Ligature se fit tout simplement sans separer L'artere d'avec le nerf; il ne survint plus d'hémorragie, quoi que la fievre ait continuée encore quelques jours; La playe s'est terminée heureusement dans L'espace de six semaines.

Favre

Chirurgien major au Regt. des Vaisseaux